

ROKO[®] AGRO POSTLAKTO DIP

OPIS

POSTLAKTO DIP jest płynem pielęgnacyjnym o działaniu dezynfekującym do zastosowania w higienie weterynaryjnej przeznaczonym do pielęgnacji strzyków po udoju. Posiada działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze wobec grzybów drożdżopodobnych. Preparat w formie gotowej do użycia.

- Zawiera kwas mlekowy jako biocyd nieutleniający
- Potwierdzona skuteczność wobec drobnoustrojów wg norm PN-EN 1656 i PN-EN 1657 w tym wobec typowych bakterii odpowiedzialnych za Mastitis
- Wzbogacony o substancje uelastyczniające naskórek zapobiegając podrażnieniom w trakcie doju
- Zawarte w składzie repelenty działają odstraszająco na owady
- Ekonomiczny w użyciu, nie skapuje ze strzyku
- Pozostawia na strzyku kolor pomarańczowy

Działanie bakteriobójcze: w czasie 5 min, temp. 30°C.

Działanie grzybobójcze: w czasie 30 min, temp. 30°C.

Substancja czynna: L-(+)-kwas mlekowy, WE: 201-196-2, CAS: 79-33-4

[zaw. 2,5g/100g]

SKŁAD

anionowe środki powierzchniowo czynne

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyglądtransparentny lub opalizujący płyn

pH 3,75 ± 0,75

Gęstość w 20°C, g/cm³.....1,010 ± 0,030

ZASTOSOWANIE Zakres zastosowania:

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej. Nanieść preparat używając kubka dippingowego na umyty przedtem strzyk. Pozostawić do kolejnego udoju.

SPOSÓB	DIPPING
STĘŻENIE [%]	100
TEMPERATURA	otoczenia
Czas kontaktu	≥5 min

PRODUKT WYŁACZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Zgodnie z instrukcją użycia preparat jest bez-pieczny dla wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody oraz skóry człowieka i zwierząt. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na powierzchnię przy długotrwałym czasie kontaktu, należy wykonać test w mało widocznym miejscu.

Zalecenia:

Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

KOMPLETNE INFORMACJE ODNOŚNIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI WYMAGANYCH PRZY PRACY Z PREPARATEM ZNAJDUJĄ SIĘ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.